

*Медицинские науки***ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ**

Борозенец К.Ф., Остальцева А.Р.

*Курский государственный
медицинский университет, Курск,
e-mail: borozenec.konstantin@yandex.ru*

Не только медицинские, но и социальные эффекты зачастую обуславливают выбор способа ведения пациентов старшего возраста, у которых при направлении в стационар могут возникнуть психологические проблемы, связанные с госпитализацией. Оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров осуществляется на уровне первичного звена, что способствует развитию первичной медико-санитарной помощи [2]. Повышение эффективности работы дневных стационаров требует глубокого и комплексного изучения организации их работы во всех секторах здравоохранения [1].

Цель исследования. Анализ эффективности терапевтического процесса у пожилых больных в дневном стационаре.

Методы исследования. Изучали истории болезней пожилых больных, лечение которых проводилось в дневном стационаре, данные отчетной формы № 14дс «Сведения о деятельности дневного стационара лечебно-профилактического учреждения». Проводили анкетирование пожилых больных, лечившихся в дневном стационаре. Оценочные критерии – медицинская и социальная составляющие результативности лечения.

Результаты исследования. В дневных стационарах пациенты пожилого возраста составляли 64,9% от всех пролеченных, что свидетельствует о востребованности данной формы лечения у больных старшего возраста. При изучении гендерных отличий в группе пациентов из многопрофильных дневных стационаров установлено, что как в терапевтических, так и неврологических и эндокринологических стационарах соотношение мужчин и женщин было практически одинаковым – 1,0:1,1,1:1,25 соответственно. Следовательно, приверженность пожилых пациентов к лечению в дневных стационарах не зависит от пола пациентов. Установлено, что в течение года в дневном стационаре пролечено 12,1% инвалидов от всех выписанных, преимущественно третьей группы (соотношение инвалидов третьей группы ко второй – 7,8:1,3 соответственно). С учетом полученных результатов можно сделать заключение, что дневной стационар у пациентов старшего возраста можно использовать не только в лечебном, но и реабилитационном процессе.

При оценке эффективности работы дневного стационара установлено, что предполагаемый результат достигнут полностью в 94,6% случаев, частично – в 5,4% случаях. Согласно данным анкетирования пациентов с учетом критерия качества диагностических и медицинских услуг в многопрофильном стационаре эффективность отличалась – $2,4 \pm 0,5 < 4,3 \pm 0,2$ соответственно. Вероятно, диагностическое обследование, ограниченное стандартами ведения больных, не соответствовало желаниям пациентов. По интегральной оценке 97,4% респондентов были удовлетворены результатами лечения в полном объеме и только 2,6% – не удовлетворены полностью.

Выводы

1. Нет гендерных отличий в группе пациентов из многопрофильных дневных стационаров.
2. Дневной стационар у пациентов старшего возраста можно использовать не только в лечебном, но и реабилитационном процессе.
3. В группе пожилых дневной стационар – эффективная форма ведения пациентов.

Список литературы

1. Гильманов А.А., Марапов Д.И., Файзуллина Р.Н. Показатели деятельности и проблемы работы дневных стационаров / Гильманов А.А., Марапов Д.И., Файзуллина Р.Н. // Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 4. Доступно по URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=26704>
2. Шестаков Г.С. Некоторые особенности оценки деятельности дневных стационаров / Шестаков Г.С., Хохлова Г.В. // Проблемы стандартизации в здравоохранении. – 2015. – № 5-6. – С.16-20.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
СКРИНИНГА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**Кожамбердина М.К., Рыскулов Б.Н.,
Жумабеккызы А.*НАО «Медицинский Университет Караганды»,
e-mail: ainur_1996@bk.ru*

Цель: оценить эффективность скрининга молочной железы в Республике Казахстан и поликлинике № 5 г. Караганды.

Рак молочной железы на сегодняшний день занимает первое место по показателям заболеваемости у женщин во всем мире и вторым наиболее распространенным раком в целом. Диагностируемое количество рака молочной железы растет с каждым днем в развивающихся странах, где большинство случаев заболевания, к сожалению, выявляется на последних стадиях. По данным ВОЗ заболеваемость и распространенность рака молочной железы в большинстве стран значительно увеличились. В 2018 году во всем мире было зарегистрировано более 2 миллионов новых случаев заболевания РМЖ (рис. 1) [1].