

2. Бурцев И.А., Крылова В.Д., Николаев А.И., Сафонов А.С., Комплекс пород бестера. М: Столичная типография, 2008. – С. 4–22.

3. Быков В.П., Смирнова В.А. Методические рекомендации «Технохимические исследования рыбы и беспозвоночных». – М.: ВНИРО, 1981. – 86 с.

4. Дубцов Г.Г. Товароведение пищевых продуктов. М.: Высшая школа, 2001. – С. 135–137.

5. Кекова М.Ю., Каменский В.К., Храминин М.В. Использование высококачественного клея из гибридных пород осетровых рыб в реставрации. М: «ЕНО», Науч.-прак. конф. «Итоги науки в теории и практике 2019», 2019. С. 43–46.

Медицинские науки

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Воронина Е.А., Еремина М.В.

*Волгоградский государственный
медицинский университет, Волгоград,
e-mail: seymey1999@yandex.ru*

Актуальность исследования определяется общедоступностью лекарственных средств, что формирует условия для развития острых отравлений в результате применения в целях самолечения и суицидальных попыток. [1].

Согласно данным социально-гигиенического мониторинга Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в 2018 году отравления лекарственными препаратами на территории Волгоградской области составили 33,0% от общего числа случаев отравлений химической этиологии. В 2018 г. было зарегистрировано 696 случаев отравления лекарственными средствами, из которых 3 (0,43%) закончились летальным исходом. Все умершие – лица старше 18 лет. Следует отметить, что 59% пострадавших в 2018 г. в данной группе отравлений составляют взрослые, 35% – дети до 14 лет, 6% – подростки. При анализе так же можно выявить гендерные различия: у женщин вызвано 45,8% случаев отравлений, а у мужчин – 23,8%. Ежегодно первое место в структуре отравлений лекарственными препаратами составляют отравления противосудорожными, седативными, снотворными, противопаркинсоническими препаратами (31,6%). Второе место занимают антибиотики и другие противоинфекционные и противопаразитарные средства системного действия – 15,2%. Аптека явилась местом приобретения химического вещества, послужившего причиной острого отравления, в 31% случаев от общего числа пострадавших в области в 2018 г.

Отравления лекарственными препаратами занимают ведущее место в структуре отравлений на территории Волгоградской области на протяжении ряда лет. Проблема лекарственной безопасности остается актуальной и требует совершенствования системы контроля реализации лекарственных препаратов.

Список литературы

1. Доника А.Д., Еремина М.В. Анализ рефлексии проектирования социального статуса специалистов медицинского профиля на додипломной стадии профессионализации // Электронный научно-образовательный вестник Здоровье и образование в XXI веке. 2016. Т. 18. № 11. С. 76–78.

ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ СПИРТСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Гайделис Д.А., Еремина М.В.

*Волгоградский государственный
медицинский университет, Волгоград,
e-mail: dashagaidelis@gmail.com*

Острые интоксикации спиртосодержащей продукцией – это медико-социальная проблема общества особой категории, затрагивающая разновозрастные группы населения и требующая пристального внимания [1].

Согласно данным социально-гигиенического мониторинга Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в структуре острых отравлений отравления спиртосодержащей продукцией занимают третье место и составляют 19,4%. В 2018 году в Волгоградской области зарегистрировано 409 таких случаев. При этом число мужчин трудоспособного возраста значительно превышает число женщин в данной категории пациентов. В исследуемой группе преобладают лица, имеющие среднее или среднее специальное образование (65,7%). Выявлено, что на первом месте среди причин – отравления этанолом, на втором – суррогатами алкоголя и на третьем – отравления метанолом. Острые алкогольные отравления среди детей и подростков составляют 16% от общего числа отравлений и занимают первое место среди причин острых отравлений химической этиологии у подростков.

Все случаи отравления спиртосодержащей продукцией с летальным исходом являются следствием употребления этанола, суррогатов алкоголя, других неуточненных спиртов и зафиксированы в группе взрослого населения (5 человек).

Полученные данные демонстрируют необходимость совершенствования профилактических мероприятий острых отравлений спиртосодержащей продукцией как на уровне токсикологической службы, так и на уровне образовательных учреждений, учреждений социальной защиты населения.

Список литературы

1. Доника А.Д., Еремина М.В. Анализ рефлексии проектирования социального статуса специалистов медицинского профиля на додипломной стадии профессионализации // Электронный научно-образовательный вестник Здоровье и образование в XXI веке. 2016. Т. 18. № 11. С. 76–78.